

OCT 3 0 1929

EN VENTE CHEZ L'AUTEUR

72,896

MÉLANGES  
EXOTICO-ENTOMOLOGIQUES

TRENTE-SEPTIÈME FASCICULE

(28 novembre 1922)

PAR

MAURICE PIC

OFFICIER D'INSTRUCTION PUBLIQUE  
OFFICIER DU MÉRITE AGRICOLE  
DIRECTEUR DE L'« ÉCHANGE »  
CORRESPONDANT DU MUSÉUM DE PARIS

MOULINS  
“ LES IMPRIMERIES RÉUNIES  
15, RUE D'ENGHien, 15

1922  
Tous droits réservés



# Nouveautés diverses<sup>(1)</sup>

---

**Heteroscapha tonkineum** n. sp. Oblongo-elongatus, nigro-piceus, membris pro parte thoraceque rufescens; elytris in disco bistriatis, antice fortiter et sparse punctatis, postice parum punctatis. Long. 5 mill. Tonkin. — Voisin de *Feai* Ach.; moins allongé, ponctuation plus forte, etc...

**Cantharis soeulensis** n. sp. Elongatus, nitidus, parum pubescens, niger, antennis ad basin testaceo notatis, thorace luteo, in disco late et longe nigro-notato, pedibus nigris, femoribus ad basin rufis, abdomine pallido marginato. Long. 9 mill. Corée. — Très voisin de *dimidiatipes* Reiche, mais devant de la tête foncé, prothorax plus longuement marqué de noir.

**C. infraterna** n. sp. Elongatus, cyaneus, elytris opacis, viridescentibus, thorace testaceo, in disco violaceo maculato, abdomen testaceo, nigro notato; antennis elongatis, testaceis, ad basin nigris. Long. 17 mill. Chine. — Voisin de *fraterna* Frm., distinct, à première vue, par les antennes plus longues et en partie testacées.

**Silis bicolorimembris** n. sp. Satis robustus, nitidus, testaceus, abdomen, antennis pedibusque pro parte

---

(1) Dans ce fascicule sont décrites diverses espèces du Laos qui proviennent toutes des récoltes de M. Vitalis de Salvaza; quelques autres, du Tonkin, proviennent aussi de lui, ce sont celles notées V. Tous les types figurent dans ma collection, quelques co-types se trouvent aussi dans la coll. Vitalis.

Dans le dernier fascicule une faute d'impression s'est produite pour un *Toxicum* (p. 13), il faut lire *curvaticorne*, au lieu de *arcuaticorne*.

nigris, elytris nigris; thorace robusto, postice parum inciso; elytris mediocre punctatis. Long. 7 mill. Indes. — A placer près de *fuscitarsis* Gorham et distinct, à première vue, par ses élytres entièrement foncés.

**S. diversehamata** n. sp. ♂. Parum elongatus, nitidus, niger, thorace testaceo, antice et lateraliter nigro notato, illo breve sulcato, postice bimaculato et denticulato. Long. 5 mill. Chine. — Voisin de *Donckieri* Pic, prothorax de structure différente et marqué de noir.

**Silidius trimaculatus** n. sp. ♀. Parum elongatus, subopacus, testaceus, antennis, capite pro parte, femoribus apice tarsisque nigris; thorace rufo, transverse nigro trimaculato, postice uarum inciso. Long. 11 mill. Madagascar. — Voisin de *trinotatus* Pic, antennes foncées à la base, tête autrement maculée, etc.

**S. maculaticeps** n. sp. ♀. Oblongo-elongatus, fere opacus, piceus, capite testaceo, postice nigro maculato; thorace lato, antice arcuato, postice breve inciso; elytris satis brevibus, costatis. Long. 9 mill. Madagascar. — Voisin de *nitidocostatus* Pic, distinct, à première vue, par la forme du prothorax et la tête plus largement testacée.

**S. testaceoscutus** n. sp. ♀. Parum elongatus, niger, thorace, illo nigro lineato, scutello, femoribus ad basin et elytris testaceis, his apice sat late nigro notatis, antennis apice flavis. Long. 10 mill. Cameroun. — Très voisin de *nolaensis* Pic, distinct, à première vue, par la tête plus foncée et l'écusson clair.

Le **S. congoensis** mihi, du Congo, très voisin du précédent, s'en distingue par le prothorax plus transversal, avec les angles postérieurs plus marqués, les cuisses largement testacées avec seulement leur extrémité noire et la tête rousse, marquée de noir entre les yeux.

**S. Hintzi** n. sp. Parum elongatus, niger, capite antice, thorace, illo nigro bimaculato, scutello, coxis,

abdomine pro parte elytrisque testaceis, his apice breve nigro notatis; thorace postice mediocre inciso et minute lobato. Long. 9 mill. Cameroun. — Distinct, à première vue, des précédents, par les antennes entièrement noires.

Le **S. notaticeps** mihi ♀, du Cameroun, a le prothorax simple, seulement marqué de noir en avant, la tête testacée, maculée de noir entre les yeux et les élytres brièvement foncés au sommet.

**S. binotatipennis** n. sp. ♀. Parum elongatus, testaceus, antennis, femoribus apice, tibiis tarxisque nigris, elytris testaceis, ad basin nigro maculatis et apice breve nigro notatis. Long. 9 mill. Cameroun. — Voisin de *Murtalai* Pic, prothorax plus large et non marqué de foncé, élytres noirs à l'extrémité, etc...

**S. magniceps** n. sp. Parum elongatus, piceus, pedibus rufescentibus, elytris testaceis; capite valido; thorace breve, supra inaequale, lateraliter ad medium dilatato, postice sinuato; elytris satis brevibus. Long. 7 mill. Erythrée. — A placer près de *deusta* Reiche.

**S. Elisabethæ.** n. sp. Elongatus, rufus, membris nigris, thorace in disco nigro notato, illo postice foveolato, lateraliter sinuato, angulis posticis paulo prominulis; elytris testaceis, lateraliter pallidioribus, ante nigro notatis. Long. 11 mill. Congo. — Voisin de *circumdatus* Pic.

**S. tanganikanus** n. sp. ♀. Parum elongatus, nitidus, niger, thorace circa et elytris testaceis, pedibus pro majore parte rufis; thorace transverso, lateraliter sinuato. Long. 8 mill. Tanganika. — A placer près de *testaceocinctus* Pic.

**S. banjoensis** n. sp. Parum elongatus, niger, thorace lateraliter elytrisque testaceis, his ad suturam nigris; thorace ad medium dilatato, postice impresso. Long. 7 mill. Cameroun. — Voisin de *Jeanneli* Pic,

prothorax différent, élytres moins étroits et finement ponctués.

**Podabrus notatithorax** n. sp. Angustatus, nitidus, niger, capite antice, antennis femoribusque ad basin et thorace testaceis, illo in disco nigro notato, elytris violaceis. Long. 11 mill. Chine. — A placer près de *langanus* Pic.

Le **P. diversipennis** mihi, de Chine, de coloration analogue au précédent, en est très distinct par les antennes presque entièrement testacées, à articles médians un peu courbés et épaisse au sommet, ainsi que par la tête plus large et le prothorax plus étroit.

**P. crassicornis** n. sp. Angustatus, nitidus, niger, capite antice, antennis pro majore parte, femoribus thoraceoque testaceis; elytris cyaneis; antennis particularibus. Long. 10 mill. Chine. — Distinct du précédent, par les antennes à articles intermédiaires plus larges et assez courts et le prothorax immaculé.

**P. curvatipes** n. sp. Angustatus, nitidus, testaceus, antennis pro majore parte, tarsis elytrisque piceis, infra corpore brunnescente; antennis parum validis; thorace elongato, lateraliter impresso; tibiis posticis apice breve curvatis. Long. 6 mill. Formose. — Voisin de *multilimbatus* Pic.

**P. atriceps** n. sp. Angustatus, nitidus, niger, thorace testaceo; antennis gracilibus; capite postice impresso; thorace elongato, parallelo. Long. 6 mill. Chine. — Voisin de *exophthalmus* Frm., distinct, à première vue, par la tête toute noire.

**Apalochrus Bingeri** n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, griseo pubescens, cyaneus aut cyaneo viridescens, antennis ad basin, pedibus pro parte abdomineque rufis; antennis flabellatis ♂, subpectinatis ♀; thorace fere lave; elytris minute punctatis. Long. 5 mill. Congo: Bingerville. — Voisin de *Sjostedti* Brg., dis-

tinct, à première vue, par la ponctuation un peu écartée et fine des élytres.

**A. subparallelus** n. sp. ♂. Elongatus, parallelus, nitidus, parum pubescens, cyaneus, capite thoraceque viridescentibus, pedibus metallicis, tibiis anticis sinnatis, intermediis parum dilatatis. Long. 4 mill. Madagascar. — A placer près de *micans* Frm.

**A. madecassus** n. sp. ♂. Oblongo-elongatus, nitidus, parum pubescens, viridi-cyaneus, antennis ad basin, tibiis anticis pro parte geniculisque rufis; tibiis anticis satis validis, intus paulo dilatatis, tibiis intermediis validis, foveolatis, intus appendiculatis. Long. 4 mill. Madagascar. — Très distinct du précédent par la structure des pattes intermédiaires.

**Eubrianax flabellicornis** n. sp. ♂. Minutus et latus, nitidus, parum punctatus, piceus, femoribus flavis; antennis longe flabellatis. Long. 2 mill. Tonkin. — Espèce très distincte par ses antennes longues et très flabellées, ainsi que par l'absence de côtes élytrales, pouvant, par ces caractères, rentrer dans un sous-genre que je nomme *Micreibrianax*.

**E. metallicus** n. sp. ♂. Major, nitidus, niger, infra corpore pro parte rufo notato, elytris metallicis, subæneis, thorace lateraliter femoribusque testaceis; antennis brevibus, longe flabellatis. Long. 7 mill. Tonkin. — Très voisin de *semiænescens* Pic, plus grand, prothorax non bordé de testacé en avant et presque subanguleux latéralement.

**Ora semibrunnea** n. sp. Subovatus, fere depresso, brunnescens, pro parte pallidior, elytris luteis. Long. 3 mill. Brésil. — Voisin de *complanata* Guer. avec l'avant-corps et les membres plus foncés.

**O. bivittata** n. sp. Subovatus, fere depresso, rufus, pro parte pallidior, antennis apice nigris, elytris pallidis, in disco longe piceo vittatis. Long. 3,5 mill. Brésil. — Voisin du précédent.

**Scirtes rufobinotatus** n. sp. Oblongo-ovatus, subconvexus, fere glaber, niger, membris, thorace laterali ter elytrisque pro parte rufis. Long. 2,5 mill. Brésil. — Paraît voisin de *dispersus* Chp., mais différent de coloration, élytres foncés, avec une macule externe antérieure et une autre antéapicale commune rousses. Varie par les élytres largement foncés antérieurement avec une macule antéapicale rousse (v. **uninotatus**), ou avec le sommet plus ou moins largement roux (v. **innotatus**).

Le **S. postimpressus** mihi, du Brésil, est très voisin du précédent, avec une coloration largement brunâtre, mais distinct par la présence d'une impression postérieure présuturale teintée de clair, ainsi que son voisinage.

**S. piceonotatus** n. sp. Subovatus, fere depresso, distincte pubescens, nitidus, rufus, infra corpore pro parte piceo, elytris ad basin et in disco ad medium piceo notatis. Long. 2 mill. Brésil. — A placer près de *Lemoulti* Pic.

Le **S. corumbanus** mihi, du Brésil, analogue de coloration, mais avec le dessin médian foncé subfascié, plutôt que maculiforme, a une forme oblongue et, par ce caractère, se distingue au premier abord.

**Cebriorhipis siamensis** v. nov. **Vitalisi.** Supra piceus, thorace brunnescente, infra corpore et pedibus rufis, his pro parte infuscatis, elytris incostatis, irregulatiter punctatis. Laos (coll. Pic et Vitalis). — Diffère au moins de *siamensis* Chevr. par les élytres sans côtes et la coloration.

**C. annamensis** n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, luteo pubescens, rufus, capite pro parte elytrisque postice vage brunnescens; elytris diverse et pro parte fortiter punctatis, postice ad suturam striolatis. Long. 17 mill. Annam. — Un peu moins allongé que le précédent, avec les élytres en partie inégaux vers l'extrémité et de coloration différente.

**Callirrhipiis Salvazai** n. sp. Elongatus, nitidus, glaber, castaneus, epipleuris, membris abdomineque rufescens; antennis mediocre flabellatis; thorace sat sparse et parum fortiter punctato, 4 impresso; elytris irregulariter punctatis, minute costulatis. Long. 15-18 mill. Laos (coll. Pic et Vitalis). — Par sa structure prothoracique, voisin de *residua* Wat.

**Ennometes impressiceps** n. sp. Elongatus, nitidus, glaber, rufo-castaneus, capite thoraceque piceis; capite antice bifovealato, in vertice sulcato; thorace fortiter et dense punctato, in medio et lateraliter profunde impresso; elytris costatis et late punctatis. Long. 20 mill. Tonkin. V. — Ressemble à *Rouyeri* Pic, mais sculpture de l'avant-corps différente et élytres nettement costés.

**Stenispa robusticollis** n. sp. Elongatus, postice paucum attenuatus, niger, supra ænescens, pro parte alutaceus; thorace robusto, sparse punctato; elytris lineato-punctatis, lateraliter pro parte striatis. Long. 6 mill. Brésil. — Voisin de *Parryi* Baly.

**S. elongata** n. sp. Angustatus, nitidus, niger, supra ænescens, paulo alutaceus, antennis ad basin rufis; thorace angustato, sparse punctato, elytris lineato punctatis, postice substriatis. Long. 5 mill. Brésil. — Plus allongé que le précédent, avec le prothorax plus étroit, les antennes marquées de roux à la base.

**Temnaspis Downesi v. nov. inlineatus.** Supra rufus, elytris postice pallidioribus, ad medium nigro fasciatis, infra corpore nigro-maculato. Laos. — Diffère au moins de *Downesi* Baly par le prothorax dépourvu de bande médiane noire.

**T. Iaosensis** n. sp. Elongatus, testaceus, capite, thorace, pectore et femoribus posticis nigro notatis, tarsis nigris, elytris cyaneis; capite lato, late nigro bimaculato; thorace lateraliter sinuato, in disco nigro lineato, lateraliter minute nigro maculato. Long. 10

mill. Laos. — Espèce très distincte par sa forme jointe à sa coloration, pouvant se placer près de *Oberthuri* Jac.

**Colobaspis bicoloriceps** n. sp. Oblongo-elongatus, testaceus, pro parte rufescens, capite postice elytrisque nigris; capite lato; thorace postice lateraliter minute tuberculato; elytris minute et sparse punctatis. Long. 8 mill. Laos. — Espèce de forme moins allongée que le précédent et très distincte par son prothorax tuberculé; ressemble, d'autre part, à *T. nigripennis* Jac., qui a la tête flave.

**C. Vitalisi** n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, niger, thorace, elytris et abdomen flavis et nigro maculatis, femoribus posticis apice flavo notatis, longe spinosis; thorace breve, postice lateraliter minute tuberculato, in disco nigro trimaculato; elytris sparse punctatis, humeris prominulis, nigro trinotatis. Long. 10-12 mill. Tonkin (coll. Pic et Vitalis). — Jolie espèce, ressemblant à *speciosus* Baly, avec le prothorax différent, tuberculé postérieurement, la fascie médiane noire des élytres très oblique, etc.

**Melixanthus pallidipennis** n. sp. Subovatus, nitidus, luteo-testaceus, thorace pro parte rufo, elytris ad basin nigro marginatis, minute brunneo lineato-punctatis; antennis brevibus, apice nigris. Long. 3 mill. Tonkin. — Voisin de *placidus* Baly, élytres à ponctuation différente.

**Cryptocephalus inhumeralis** n. sp. Parum elongatus, nitidus, testaceus, capite postice, antennis pro majore parte tarsisque nigris; thorace testaceo, in disco nigro bilineato; elytris rufo-testaceis, ad medium nigro undulato-fasciatis, pro parte lineato-punctatis. Long. 4 mill. Tonkin. — Jolie espèce pouvant se placer près de *rufofemoratus* Jac.

**C. externereductus** n. sp. Oblongus, nitidus, niger, elytris testaceis, ad humeros et ad medium nigro ma-

culatis. Long. 5 mill. Tonkin. — Voisin de *baolacanus* Pic et distinct, à première vue, par la présence, sur les élytres, d'une macule, au lieu d'une bande.

**C. crassipennis** n. sp. Robustus, niger, antennis ad basin, thorace lateraliter, elytris ad scutellum, ad medium et lateraliter apiceque luteo maculatis. Long. 8 mill. Tonkin. — Espèce très distincte par sa forme robuste, jointe à ses dessins élytraux.

**C. binhanus** n. sp. Subovatus, nitidus, rufus, antennis pro majore parte tarsisque nigris, elytris lateraliter plus minusve testaceis, in disco plus minusve nigris et ad scutellum testaceo maculatis. Long. 3-4 mill. Tonkin. — Voisin de *brevelineatus* Pic.

**C. lacosus** n. sp. Oblongus, nitidus, testaceus, antennis apice nigris; thorace fere impunctato; elytris nigro 4-maculatis (2,2) et lineato punctatis. Long. 5 mill. Tonkin. — Voisin de *Deyrollei* Pic, plus robuste avec les élytres bimaculés, et non fasciés, postérieurement.

**C. brunneopunctatus** n. sp. Oblongus, nitidus, testaceus, elytris brunneo lineato-punctatis, antennis apice nigris. Long. 4,5-5 mill. Tonkin. — Voisin du précédent, très distinct par les élytres dépourvus de macules foncées et la ponctuation élytrale plus profonde.

**C. senensis** n. sp. Minutus, parum elongatus, nitidus, niger, antennis ad basin, pedibus anticis, capite pro parte thoraceque testaceis, illo in disco et postice nigro notato; elytris minute lineato punctatis. Long. 3 mill. Chine. — A placer près de *yunnanus* Pic.

**C. infraflavus** n. sp. Oblongus, nitidus, pallidus, elytris nigris, minute lineato-punctatis; epipleuris aliquot testaceis (v. *diversepleuris*). Long. 5-6 mill. Tonkin. — Voisin de *dimidiatus* Laf. et distinct, à première vue, par l'écusson plus ou moins flave.

**Strangalia rufovittata** n. sp. Angustatus, niger, subopacus, pedibus et abdomine pro parte testaceis, antennis ante apicem albidis, elytris rufo bivittatis, vitta lateralis interrupta; thorace longissimo, antice attenuato; elytris apice bidentatis. Long. 17 mill. Tonkin V. — Peut se placer près de *nymphula* Bates.

**Microrabdium laticeps** n. sp. Elongatus, fere opacus, fortiter et dense punctato-foveolatus, sparse luteopubescens, piceus, membris rufescentibus; capite lato; antennis corpore paulo longioribus; thorace elongato, lateraliter sinuato; elytris thorace valde latioribus, subparallelis. Long. 12 mill. Chine. Plus large que *parallelum* Pic, élytres plus fortement ponctués.

**Chapaon apicale** n. sp. Elongatus, fere opacus, testaceus, antennis pedibusque nigris, femoribus anticis late testaceis, abdomine brunnescente, elytris apice breve piceo notatis. Long. 8 mill. Tonkin. — Moins allongé que *rufum* Pic, avec les élytres brièvement foncés au sommet.

**Ibidiomimus inapicalis** n. sp. Testaceus, antennis ad basin pedibusque pro majore parte nigris. Long. 10-11 mill. Tonkin. — Distinct de *bicoloripes* Pic par les élytres dépourvus de macule apicale noire et le prothorax moins allongé.

**Artimpanza argenteonotata** n. sp. Elongatus, nitidus, rufus, elytris nigris, ad humeros rufo-notatis, scutello argenteo, infra corpore argenteo trimaculato. Long. 16 mill. Tonkin. — A placer près de *bicolor* Pascoe.

**Pseudomythodes** n. gen. Antennis ad medium longe fasciculato-pilosis; thorace elongato, antice transverse sulcato, postice strangulato, in disco bigibboso; elytris satis brevibus, parallelis, ad suturam irregulariter impressis; pedibus elongatis, pilosis, femoribus apice valde dilatatis. — Par sa structure antennaire, se rapproche de *Mythodes* Ths., mais le prothorax est différent, les élytres sont inégaux vers la suture, etc.

**Pseudomythodes rufipes** n. sp. Parum elongatus, nitidus, nigro-cærulescens, elytris violaceo-cupreis, articulo 1° antennarum apice pedibusque rufis; thorace pro majore parte dense areolato-punctato; elytris sparse et irregulariter punctatis. Long. 15 mill. Laos.

**Thranius granulatus** n. sp. Angustatus, piceo-casta-neus, pro parte griseo-pubescent, opacus, antennis ante apicem albidis, femoribus ad basin, tarsis et infra corpore pro parte testaceis; thorace antice elevato-gibboso; elytris granulatis, integris, apice spinosis. Long. 18-25 mill. Laos (coll. Pic et Vitalis). — Voisin de *simplex* Gah. et s'en distinguant au moins par sa sculpture élytrale et le dessous de la tête testacée.

**Halmenida** n. gen. Antennis robustis, apice dilatatis, longe pilosis; thorace elongato, ad basin strangulato, margine postice fere recto; elytris eburneo subfasciatis; pedibus validis, longe pilosis. — Voisin de *Halme* Pasc., par son faciès, mais prothorax différent, fascie éburnée plus large; ses pattes longuement pileuses rappellent celles de *Mida* Pascoe, avec une forme plus robuste.

**Halmenida purpurea** n. sp. Parum élongatus, nitidus, rufo-purpureus, antennis apice brunneis, elytris breve et eburneo arcuate fasciatis. Long. 10 mill. Laos.

**Eipedocera Vitalisi** n. sp. Parum elongatus, opacus, rufus, infra corpore et antennis pro parte piceis, elytris nigris, apice et antice late rufis, ad medium eburneo arcuate-fasciatis, apice ad suturam dentatis. Long. 9-11 mill. Laos (Coll. Pic et Vitalis). — A placer près de *leucaspis* Pasc.

**E. Vitalisi v. nov. longipes.** Diffère de la forme type par les cuisses postérieures dépassant les élytres, les élytres moins parallèles, foncés en avant et seulement brièvement marqués de roux vers l'écusson. Laos.

**E. rufipennis** n. sp. Satis robustus, opacus, rufus, capite, thorace et infra corpore pro parte piceis; thorace satis robusto; elytris ad medium eburneo fasciatis, apice bidentatis. Long. 12 mill. Tonkin. — Voisin de *Guerryi* Pic, plus robuste avec les élytres roux.

**Bicon ruficeps** n. sp. Parum elongatus, opacus, niger, supra rufus, scutello et infra corpore argenteo pilosis. Long. 10 mill. Laos. — A placer près de *sanguineus* Pasc., en diffère par la coloration du dessus uniformément rousse.

**Xylotrechus magnificus** n. sp. Elongatus, subparallelus, niger, capite, thorace et infra corpore late luteo pubescentibus, elytris ad basin nigris, postice longe luteis et nigro bifasciatis, fascia prima obliqua, secunda fere recta; capite unicarinato; thorace globuloso. Long. 27 mill. Laos. — A placer près de *chinensis* Chevr.

**X. Vitalisi** n. sp. Elongatus, niger, capite thoraceque supra rufis, infra corpore albo notato; elytris nigris, ad humeros et apice late albo pubescentibus, albo bifasciatis, fascia prima ad scutellum remota, fascia secunda fere recta, ad suturam dilatata; capite minute unicarinato; thorace satis elongato, ad basin albo marginato; scutello albido. Long. 10-11 mill. Laos (coll. Pic et Vitalis). — Peut se placer près de *quadripes* Chevr.

**X. trimaculatus** n. sp. Parum robustus, niger, luteo pubescens, antennis apice rufis, elytris nigris, luteo fasciatis; capite 4 carinato; thorace robusto, postice paulo dilatato, in disco maculis nigris tribus (2,1) ornato; elytris quinque rufo-luteo fasciatis. Long. 13 mill. Tonkin. — Par ses dessins élytraux rappelle *arvicola* Ol., mais la deuxième fascie est nettement ondulée postérieurement et la fascie antéapicale est nettement jointe sur la suture à l'apicale oblique.

**X. curtithorax** n. sp. Parum robustus, niger, luteo

pubescens, antennis apice, tibiis tarsisque rufis, elytris nigris, luteo maculatis et fasciatis; thorace robusto, postice dilatato, nigro trimaculato, macula mediana postice dilatata. Long. 18 mill. Tonkin. — Les dessins élytraux se rapprochent de ceux de *trimaculatus* mihi, mais la deuxième bande est plus large et plus arquée et les élytres ont, en dessous des épaules, une grosse macule, au lieu d'une courte bande transversale droite, en outre le prothorax est différent.

Le **X. longithorax** n. sp., du Tonkin, est très voisin du précédent, avec un dessin analogue, mais le front est finement unicaréné, le prothorax est étroit et plus long, orné d'une bande transversale noire, les élytres sont plus courts et les cuisses postérieures bien plus longues. Long. 9 mill.

**Chlorophorus brevenotatus** n. sp. Oblongus, niger, griseo-olivaceo pubescens, elytris ad basin breve nigro lineatis, ante et post medium nigro fasciatis, fascia prima angustata, 2<sup>a</sup> lata. Long. 10 mill. Tonkin. — Voisin de *varius* Mul., mais prothorax sans macule foncée, élytres sans lunule antérieure noire.

**C. reductus** n. sp. Oblongus, niger, griseo-olivaceo pubescens, elytris nigro 4-fasciatis, fascia prima transversa, secunda obliqua et reducta, tertia mediana, parum lata, quarta postmediana lata. Long. 10 mill. Tonkin. — Voisin du précédent, prothorax moins robuste et dessins des élytres différents.

**C. binhensis** n. sp. Elongatus, niger, griseo-olivaceo pubescens, elytris nigro trifasciatis, fascia prima antice trilobata, sutura ad medium nigra. Long. 9-10 mill. Tonkin. — Espèce de forme plus allongée que les précédentes, avec deux larges fascies maculiformes postérieures et une antérieure particulière, plus ou moins prolongée en branches antérieurement, les branches se rapprochent de la base ou s'étendent vers les épaules.

**Hecyrida uniformis** n. sp. Modice elongatus, niger, fere uniformiter fulvo aut griseo pubescens, elytris ad basin nigro fasciculatis et postice albo hirsutis; antennis parum brevibus, ad basin griseo annulatis; thorace subtransverso, in disco multi noduloso et punctato, antice transverse sulcato; elytris parum elongatis, postice paulo attenuatis, apice subtruncatis. Long. 16 mill. Tonkin. — Voisin de *asiatica* Pic, revêtement différent et prothorax autrement conformé.

**Mesosa sparsenotata** n. sp. Robustus, niger, griseo pro parte rufo pubescens, capite thoraceque nigro lineato, elytris diverse et minute nigro notatis; articulis 3 et sequentibus antennarum ad basin griseo pubescens, femoribus nigro maculatis. Long. 16-18 mill. Tonkin. — Voisin de *luteopubens* Pic, distinct, à première vue, par son revêtement différent.

**Lycrosis rufipennis** n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, niger, elytris rufis, sat fortiter et pro parte lineato punctatis, membris pro parte griseo notatis; capite parum breve; thorace subquadrato, fortiter et irregulariter punctato. Long. 12 mill. Tonkin. — Espèce très distincte par sa coloration jointe à sa forme *dorcadio-niforme*.

**Olenecamptus interruptus** n. sp. Satis brevis, opacus, niger, capite thoraceque lateraliter albo lineatis, elytris in disco albo bilineatis, lineis pro parte interruptis. Long. 10 mill. Tonkin. — Espèce très distincte par sa forme peu élargie jointe à sa coloration.

**Erysamena undulata** n. sp. Parum elongatus, opacus, niger, pro parte griseo pubescens, elytris griseo undulatis. Long. 7-8 mill. Tonkin. — Voisin de *indentata* Pic et distinct par les élytres à bandes ondulées grises encerclant en partie des points noirs.

**Serixia tonkinea** n. sp. Oblongus, subnitidus, rufo-testaceus, oculis antennisque apice nigris; capite lato; thorace breve, postice strangulato, disperse punctato;

elytris brevibus, lineato-punctatis, apice subrotundatis. Long. 6 mill. Tonkin. — Très distinct de *modesta* Pascoe par la coloration et les élytres non dentés au sommet.

**Pseudanæstetis** n. gen. Ad genere *Anæsthetis* Muls. vicinus sed antennis pedibusque validioribus et thorace robusto, postice lateraliter spinoso, distinctus.

**Pseudanæsthetis langana** n. sp. Elongatus, nitidus, rufus, membris nigris, femoribus ad basin rufis; thorace in disco fortiter pro parte foveato punctato; elytris sat fortiter punctatis. Long. 9 mill. Tonkin.

**Phunginus** n. gen. Corpus elongatus; oculis approximatis, valde emarginatis; antennis crassis, hirsutis; thorace lateraliter non gibboso; pedibus brevibus et validis. — Genre ressemblant un peu à *Anæsthetis* Muls., mais très distinct par ses membres robustes.

**Phunginus apicalis** n. sp. Elongatus, nitidus, hirsutus, rufus, elytris ad apicem nigro notatis et albo maculatis; thorace griseo vittato; elytris infra humeros breve griseo vittatis, fortiter et dense punctatis. Long. 7 mill. Tonkin.

**Chreonomia atricornis** n. sp. Parum elongatus, nitidus, pubescens, rufus, oculis antennisque nigris; capite lato; thorace breve, medio gibboso; elytris thorace paulo latioribus, sat fortiter punctatis, humeris prominulis. Long. 12 mill. Tonkin. — Distinct de *pallida* Ths. par les antennes entièrement foncées.

**Allecula subæneipennis** n. sp. Elongatus, postice attenuatus, nitidus, niger, elytris subæneis, membris abdomineque apice testaceis; thorace parum breve, dense punctato, postice impresso; elytris striato-crenulatis, intervallis lœvibus; pedibus satis validis. Long. 13 mill. Laos. — Voisin de *ænea* Pic, plus atténue en arrière avec les membres testacés.

**A. Salvazai** n. sp. Oblongo-elongatus, fere opacus,

niger, femoribus ad basin late testaceis; thorace parum breve et angustato, densissime punctato; elytris punctato-striatis, intervallis subdepressis; pedibus satis elongatis. Long. 11-14 mill. Ventiane (coll. Pic et Vitalis). — Voisin de *lata* Frm., mais non brillant avec les tibias noirs.

**A. luridipes v. nov. ingeniculata.** Satis elongatus, nitidus, niger, pedibus testaceis. Laos. — Distinct au moins de *luridipes* Frm. par la coloration concolore des pattes.

**A. ruficolor** n. sp. Elongatus, nitidus, rufo-testaceus, membris pallidioribus; thorace parum breve, dense punctato; elytris striato-crenulatis, intervallis subconvexis, minute punctatis; pedibus satis elongatis. Long. 13 mill. Laos. — Espèce très distincte par sa coloration jointe à sa forme allongée.

**A. sulcatithorax** n. sp. Elongatus, parum nitidus, piceus, elytris apice brunnescentibus, thorace parum breve, densissime punctato, sulcatulo; elytris striato-crenulatis, intervallis subconvexis, punctatis; pedibus validis. Long. 18 mill. Laos. — Très voisin de *diversipes* Pic, mais pattes moins robustes et simples.

**A. cambodgensis** n. sp. Oblongo-elongatus, postice attenuatus, nitidus, membris elytrisque postice rufescenscentibus; thorace subquadrato, sat dense punctato; elytris striato-crenulatis, intervallis fere lœvibus; pedibus satis validis. Long. 15 mill. Cambodge. — Voisin de *arcuatipes* Frm., prothorax moins fortement ponctué et élytres rétrécis presque dès la base.

**A. longipes** n. sp. Oblongo-elongatus, parum nitidus, pubescens et hirsutus, niger, antennis pro parte tarsisque rufescenscentibus; thorace parum breve et angustato, densissime punctato; elytris striato-punctatis; intervallis subconvexis, punctatis; femoribus parum crassis, longissimis. Long. 14-15 mill. Laos (coll. Pic et Vitalis). — A placer près de *Vitalisi* Pic, très

distinct par sa taille, sa coloration et ses longues pattes.

**A. vientianensis** n. sp. Elongatus, parum pubescens, subopacus, rufescens, elytris pro parte brunneis, membris testaceis, femoribus apice et tibiis ad basin paulo piceis; thorace parum breve et angustato, dense punctato; elytris striato-crenulatis; pedibus brevibus, crassioribus. Long. 8-9 mill. Vientiane (coll. Pic et Vitalis). A placer près de *spinipes* Pic.

**A. brevesuturalis** n. sp. Elongatus, antice et postice attenuatus, sparse pubescens, nitidus, rufus, infra corpore pro parte brunnescente, antennis ad basin pedibusque testaceis, geniculis et antennis apice nigris, elytris testaceis, ad suturam et lateraliter paulo brunnescentibus. Long. 8 mill. Tonkin, V. — Voisin de *cinctipennis* Pic, plus grand, prothorax moins densément ponctué, genoux noirs, etc.

**A. tibialis** n. sp. Oblongo-elongatus, subopacus, rufescens, capite thoraceque piceis, elytris striato-crenulatis; pedibus validis, tibiis intus angulatis aut dentatis. Long. 15 mill. Laos. — Espèce voisine de *diversipes* Pic, très distincte par la structure de ses pattes.

**A. crassifemur** n. sp. Oblongo-elongatus, parum nitidus, nigro-piceus, elytris brunnescens, femoribus ad basin late testaceis, his validis; thorace parum angustato, sat dense punctato; elytris striato-crenulatis, apice subacuminatis. Long. 15 mill. Laos. — Distinct du précédent par la coloration et la structure des pattes dont les tibias sont simples.

**A. curtipes** n. sp. Elongatus, parum nitidus, niger, thorace breve, dense punctato; elytris punctato-striatis, intervallis convexis, punctatis; pedibus satis gracilibus, femoribus posticis paulo brevibus. Long. 13 mill. Tonkin. — Ressemble à *longipes* Pic, distinct, à première vue, par les cuisses postérieures plus courtes que les élytres.

**A. elongatipennis** n. sp. Angustatus, nitidus, niger, antennis testaceis, piceo annulatis; thorace breve, fortiter sat sparse punctato; elytris striato-punctatis, intervallis parum punctatis. Long. 12 mill. Annam. — Espèce caractérisée par sa forme étroite et allongée.

**A. hirsutus** (1) n. sp. Elongatus, nitidus, fulvo-hirsutus, niger, membris testaceis, femoribus apice nigris; thorace parum angustato, fortiter et dense punctato; elytris striato-punctatis, intervallis parum punctatis; pedibus satis elongatis. Long. 13 mill. Tonkin.

— Voisin du précédent.

**Borneocistela diversicornis** n. sp. Angustatus, nitidus, luteus, antennis tricoloribus, tarsis pro parte nigris. Long. 12 mill. Cochinchine. — Distinct, à première vue, de *pallidi-color* Pic, par les antennes tricolores, noires, rousses à l'extrémité, avec le premier article testacé.

**Borboresthes sinuaticollis** n. sp. Elongatus, antice et postice attenuatus, nitidus, testaceus; thorace breve, postice sinuato et impresso, sat sparse punctato et alutaceo; elytris striato-punctatis, intervallis satis latis, subdeplanatis, parum punctatis. Long. 10 mill. Laos, V. — Caractérisé par sa forme étroite.

**B. subfasciata** n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, rufescens, elytris postice vage piceo fasciatiss, membris testaceis; thorace breve, minute et sparse punctato; elytris striato-punctatis. Long. 8 mill. Tonkin. — Voisin de *navicularis* Frm., très distinct par sa coloration élytrale, la fascie foncée de ces organes se prolongeant postérieurement sur la suture.

**Cistelopsis tonkinea** n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, fusco pubescens, piceus, supra pro parte rufescens, tarsis rufis; thorace transverso, minute et dense

---

(1) *Allecula viridipennis* Pic (1919) préoccupé par *viridipennis* Pic (1914) devra prendre le nom de *semiviridis*.

punctato; elytris minute striato-punctatis, intervallis deplanatis, punctatis. Long. 4 mill. Tonkin. — Plus allongé que *sparsepunctata* Pic et autrement ponctué.

**C. punctata** n. sp. Elongatus, subparallelus, nitidus, rufescens; thorace fortiter punctato; elytris minute striato-punctatis, intervallis punctatis. Long. 5 mill. Tonkin. — Espèce très distincte par sa forme et la forte ponctuation du prothorax.

**C. striatipennis** n. sp. Oblongo-elongatus, dense punctatus, rufo-castaneus, pedibus antennisque ad basin late rufis, elytris distincte striatis. Long. 4 mill. Laos. — Espèce très distincte par ses élytres nettement striés.

**C. testaceicornis** n. sp. Elongatus, nitidus, luteo-pubescentes, testaceus, pedibus pallidioribus; thorace breve, antice attenuato, dense punctato; elytris elongatis, minute lineato-punctatis. Long. 4 mill. Indes. — Plus allongé que *malaccana* Pic avec la sculpture du dessus différente, les antennes testacées, etc...

**C. piceolateralis** n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, subdepressus, rufus, elytris lateraliter piceis, pedibus testaceis, antennis nigris, ad basin rufis; thorace deplanato, sparse punctato; elytris minute lineato-punctatis. Long. 5 mill. Mahé. — Voisin de *malaccana* Pic, moins convexe, avec les élytres plus finement ponctués.

**B. rufoapicalis** n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, fulvo pubescens, piceus, elytris apice rufis, membris testaceis; thorace parum breve, fortiter sat dense punctato; elytris striato-punctatis, intervallis convexis, punctatis. Long. 7 mill. Laos. — Espèce très distincte par sa coloration.

Le **C. lateralis** mihi, de Sumatra, de coloration analogue au précédent, mais un peu plus claire sur le dessus, en diffère par les yeux plus grands et les élytres nettement striés latéralement.

Le **C. maheensis** mihi, de Mahé, est moins déprimé que le précédent, avec le prothorax densément ponctué et offre une coloration générale roussâtre, avec les membres testacés.

**C. Dohertyi** n. sp. Angustatus, convexus, parum nitidus, rufus, elytris lateraliter nigris; thorace depresso, sat sparse punctato; elytris angustatis, sat striatis et lineato punctatis. Long. 4 mill. Malacca. — Espèce caractérisée par sa forme étroite jointe à sa coloration. — Genre *Microcistela* Pic (1919) à muter en **Microcistelopsis**, à cause de *Microcistela* Pic (1904).

**Hylophilus maculatus** n. sp. Elongatus, nitidus, semihirsutus, rufus, capite brunnescente aut nigro, elytris late nigro notatis; antennis elongatis ♂, parum brevibus ♀; capite postice truncato, oculis distantibus; thorace parum elongato, fortiter punctato; elytris elongatis ♂, aut brevioribus ♀; pedibus posticis validis, tibiis anticis curvatis, intus subsinuatis ♂. Long. 3 mill. Fernando-Pô. — Voisin de *maculipennis* Pic, macule élytrale plus grande, yeux plus écartés, avec les tibias antérieurs moins sinués.

**H. subangulatus** n. sp. ♂. Oblongus, nitidus, sparse griseo pubescens, rufus; antennis elongatis, articulo tertio breve, capite subtruncato, parum punctato, oculis paulo distantibus; thorace subquadrato, sat fortiter punctato; elytris parum elongatis, sat fortiter punctatis; femoribus inermibus, tibiis anticis ante apicem intus angulatis. Long. 2,5 mill. Fernando-Pô. — A placer près de *dentatipes* Pic, pattes antérieures de structure différente.

**H. curtus v. nov. Isabellæ** ♂. Capite elytrisque nigris, his pro parte denudatis, thorace rufescente, tibiis anticis non crassis. Fernando-Pô. — Distinct de la forme type par les tibias postérieurs plus minces et la coloration.

**H. modestus** n. sp. Oblongus, nitidus, griseo pubes-

cens, testaceus, antennis late brunnescentibus, his satis validis; capite lato, subtruncato, oculis distantibus; thorace subquadrato, ad basin impresso; elytris brevibus, antice distinete impressis, fortiter punctatis; pedibus gracilibus. Long. 2 mill. Cameroun. — Peut se placer près de *nigriclava* Escal., prothorax moins robuste, à impression basale fovéolée, yeux plus grands, etc.

*Hylophilus bimaculatus* Esc. (1922), préoccupé par *bimaculatus* M. R., devra prendre le nom de **centromaculatus** et *v. immaculatus* Escal. (1922), préoccupé par *immaculatus* Lea., celui de **Manueli**; *filicornis* Esc. (1922), préoccupé par *filicornis* Schf., est à muter en **Fernandi** et la var. *obscuripennis* Esc. (1922), préoccupé par *obscuripennis* Pic, à muter en **mutatus**; *nigriclavus* Esc. (1922), préoccupé par *nigriclavus* Lea. (1917), est à muter en **atriclavus**.

**Clipa apicalis** n. sp. Elongatus, postice attenuatus, griseo-luteo pubescens, pro parte denudatus, elytris lineis flexuosis, maculis nigris includentibus, apiceque pilosis. Long. 9 mill. Laos. — Voisin de *malaccana* Pic, avec les bandes flexueuses des élytres moins sinuées, plus rapprochées et une large macule apicale pubescente.

Le **G. laosensis** mihi, du Laos, voisin, ayant une forme moins allongée, présente un dessin élytral différent, fait de trois fascies grises transversales sinuées, à peu près également espacées et pas de macule apicale.

**G. Sauteri v. nov. atripes.** Pedibus anticis nigris. Laos.

**Macrosiagon Leseleuci v. nov. Vitalisi.** Rufus, thorace nigro maculato, infra corpore pedibusque variabiliter nigro notatis. Cambodge et Laos (coll. Pic et Vitalis).

**M. Leseleuci v. nov. inapicalis.** Elytris nigris, infra corpore pro majore parte nigro, Laos.

**Simianus bicoloripes** n. sp. Angustatus, parum nitidus, testaceus, capite antice late, antennis, articulo primo testaceo excepto, tibiis tarsisque nigris. Long. 12 mill. Laos. — Espèce très distincte par sa coloration.

**Dapsiloderus maculaticeps** n. sp. Angustatus, niger, capite supra rufo notato, thorace elytrisque rufo-carmineis; thorace sulcato; elytris fortiter costatis. Long. 15 mill. Tonkin, V. — A placer près de *miniaceus* Chp.

**Perakianus lineaticollis** n. sp. Angustatus, niger, infra corpore metallico, elytris thoraceque rufis, illo in disco nigro lineato et lateraliter nigro maculato. Long. 10 mill. Laos. Voisin de *atriceps* Pic avec le dessous plus métallique et le prothorax autrement marqué de noir.

**Xanthochroa testaceithorax** n. sp. Angustatus, cya-neo aut viridi-metallicus, thorace testaceo; elytris elongatis, costatis, dense rugulosis. Long. 15-20 mill. Tonkin (coll. Pic et Vitalis). — Voisin de *atriceps* Lewis.

**X. atricornis** n. sp. Angustatus, parum nitidus, pallidus, infra corpore pro parte brunnescente, antennis, tibiis tarsisque piceis. Long. 13 mill. Tonkin (coll. Pic et Vitalis). — A placer près de *Hilleri* Har.

Le **X. angustata** mihi, du Tonkin, analogue au précédent par sa coloration, seulement un peu plus pâle, en diffère par la forme plus étroite, le prothorax moins large et les yeux plus rapprochés.

**X. violaceonotata** n. sp. Angustatus, parum nitidus, pallidus, antennis, tibiis tarsisque piceis, elytris apice minute violaceo notatis. Long. 10 mill. Tonkin. — Espèce très distincte par la macule violacée terminale des élytres.

**Asclera Vitalisi** n. sp. Oblongus, fere opacus, griseo pubescens, viridi-metallicus, thorace testaceo, minute et sparse punctato, antennis plus minusve rufescentibus. Long. 10-11 mill. X. Klunang (coll. Pic et Vitalis). — Très distinct de *rugosipennis* Pic par la ponctuation fine du dessus du corps et le prothorax peu impressionné.

**A. longipennis** n. sp. Elongatus et angustatus, dense punctatus, opacus, niger, elytris subcoeruleis, thorace testaceo. Long. 10 mill. Tonkin. — Plus allongé que le précédent, avec le prothorax densément ponctué.

**A. griseicornis** n. sp. Oblongus, fere opacus, fortiter et dense punctatus, viridi-metallicus, thorace testaceo, antennis piceis, ad basin rufis, griseo pubescentibus, pedibus nigro-eyaneis, pubescentibus. Long. 12 mill. Tonkin. V. — Voisin de *rugosipennis* Pic, distinct, à première vue, par le prothorax plus fortement ponctué et profondément impressionné.

**Leichrodes trilineatus** n. sp. Subovatus, convexus, nitidus, luteus, elytris signaturis nigris ornatis, his pro parte lineato-punctatis, pro parte irregulariter punctatis. Long. 2 mill. Ceylan. — Voisin de *lineotatus* Pic, moins large, ponctuation élytrale différente et dessins noirs des élytres différents, représentés, sur le disque, par 2 lignes raccourcies internes et une externe plus longue, en plus une macule apicale, suture noire. Parfois les élytres offrent 2 macules noires presuturales supplémentaires, c'est alors la var. **multilineatus**.

**L. Grouvellei** n. sp. Subovatus, convexus, nitidus, rufus, antennis et elytris circa irregulariter nigris, his minute lineato punctatis; ♂ capite antice minute bicornuto. Long. 2,5 mill. Java. — Peut se placer près de *fasciatus* Pic.

**L. Grouvellei v. nov. rufonotatus.** Elytris nigris, antice et postice rufo notatis. Ceylan.

**Leprocaulus rotundicollis** n. sp. Oblongus, niger, antennis apice tarsisque brunnescens; capite parum punctato, triimpresso; thorace lateraliter subrotundato, irregulariter plicato-tuberculo, in disco foveolato; elytris latis, disperse tuberculatis, lineato et diverse punctatis. Long. 12 mill. Bornéo. — Très distinct de *clavipes* Frm., par la forme du prothorax. Cet organe étant dépourvu de carène latérale, cette espèce peut rentrer dans un nouveau sous-genre que je nomme **Pseudoderosphaerus**.

**L. attenuatus** n. sp. Elongatus, niger, antennis pedibusque pro parte rufis; capite irregulariter punctato; thorace satis elongato, postice attenuato, in disco trisulcato et dense ruguloso-plicato; elytris satis elongatis, antice attenuatis, pro parte foveolatis, pro parte carinato-tuberculatis, his apice rufescentibus. Long. 10-12 mill. Chine. — Espèce très distincte de *clavipes* Frm. par la forme allongée, les élytres rétrécis à la base.

**L. angustatus** n. sp. Angustatus, piceus, labro, antennis tarsisque rufis; thorace parum breve, dense punctato-ruguloso; elytris elongatis, postice paulo dilatatis et apice attenuatis, lineato punctatis et paulo plicatis, intervallis convexis, minute tuberculatis. Long. 8 mill. Djarjeeling. — Très distinct par sa forme étroite et allongée.

**Paragonocnemis curtus** n. sp. Oblongus, piceus, pro parte rufescens, elytris subæneis, costatis, intervallis biseriatim punctato-impressis; thorace satis breve, triareolato. Long. 3 mill. Gabon. — Voisin de *foveicollis* Frm., plus large, élytres plus courts et brillants, prothorax à longue aréole médiane peu resserrée au milieu.

Le **P. longipennis** mihi, du Gabon, long. de 5 mill., est entièrement noir, plus allongé avec les élytres moins fortement ponctués et le prothorax orné de deux aréoles médianes.

**Gonocnemis vicinus** n. sp. Parum elongatus, nitidus, glaber, niger, elytris viridescentibus, pedibus rufis; oculis approximatis; thorace non transverso, fortiter sat dense punctato; elytris fortiter lineato-punctatis, intervallis subcostatis. Long. 8 mill. Gabon. — Voisin de *rubripes* Frm., prothorax moins large et plus brillant, élytres à ponctuation plus forte.

**C. pubescens** n. sp. Minutus, oblongus, subopacus, rufus, luteo pubescens; oculis approximatis; thorace breve, dense punctato; elytris parum latis, minute punctato-crenulatis, intervallis costatis. Long. 4,5 mill. Congo. — Voisin de *quadricollis* Frm., prothorax plus large, élytres moins allongés, etc.

**Mimosynopticus** n. gen. Capite antice depresso, oculis valde distantibus, antennis apice páulo dilatatis; thorace lateraliter marginato, postice sinuato; femoribus anticis indentatis. Paraît voisin de *Synopticus* Ths. et s'en distinguant, à première vue, par la forme de la tête déprimée en avant et sans oreillettes antennaires.

**Mimosynopticus parvulus** n. sp. Oblongus, opacus, rufus; thorace parum breve, antice attenuato, dense punctato; elytris thorace parum latioribus, brevibus, apice attenuatis, costatis, intervallis parum punctatis. Long. 3 mill. Afrique Or.

**Macrosynopticus** n. gen. Capite breve, oculis valde distantibus; thorace breve, in disco sulcato et antice longe gibboso; elytris thorace non latioribus, apice attenuatis; pedibus satis validis, femoribus inermibus; prosterno postice parum inclinato, metasterno antice inciso. — Se rapproche de *Synopticus* Ths. par la structure de la tête et par les pattes, bien distinct par la forme particulière du prothorax.

**Macrosynopticus costatus** n. sp. Oblongo-ovatus, fere opacus, niger, fuliginosus, thorace plicato et punctato; elytris thorace non latioribus, postice attenuatis,

costatis, intervallis inæqualibus et pro parte lineato-punctatis. Long. 7-8 mill. Laos (coll. Pic et Vitalis).

**Atasthalus tuberculatus** n. sp. Oblongus, elongatus, brunnescens, pro parte rufus; capite inter oculos minute et quadri tuberculato; thorace postice fere recto, lateraliter antice denticulato, supra tuberculato et antice breve et late bicornuto; elytris fortiter lineato-punctatis et pro parte fortiter tuberculatis. Long. 9 mill. Laos. — Ressemble à *miles* Geb. ♀ et paraît s'en distinguer, à première vue, par la structure du prothorax et les élytres plus fortement tuberculés.

**Bolitonæus tonkineus** n. sp. Oblongus, niger, pro parte fulvo cretosus, supra diverse tuberculatus; capite minute tuberculato, ♂ ♀; thorace antice bigibboso ♀, aut late et subsinuato bicornuto ♂, lateraliter crenulato; elytris in disco irregulariter et diverse tuberculatis. Long. 7 mill. Tonkin. — A placer près de *capricornis* Geb., moins trapu, cornes du ♂ un peu courbées, etc.

**Spinoderosphaerus** n. gen. Corpus elongatus; oculis distantibus, antennis brevibus, apice dilatatis; thorace transverso, pro majore parte marginato; pedibus brevibus, femoribus anticis dentatis. — Genre voisin de *Derosphaerus* Th. avec le prothorax différent et les fémurs dentés.

**Spinoderosphaerus brevicornis** n. sp. Elongatus, nitidus, castaneus, aut piceus; capite thoraceque fortiter et parum dense punctatis; elytris postice paulo dilatatis, mediocre striato-punctatis, intervallis subconvexis, minute punctatis. Long. 8-10 mill. Tonkin.

**Derosphaerus thibetanus** n. sp. Elongatus, nitidus, niger; thorace mediocre, sat sparse punctato; elytris fere instriatis, minute lineato-punctatis, intervallis punctatis. Long. 12 mill. Thibet. — A placer près de *alutaceus* Frm.

**D. binhanus** n. sp. Elongatus, nitidus, niger; tho-

race mediocre sat sparse punctato; elytris fortiter striato-punctatis, intervallis subconvexis, lœvibus. Long. 10 mill. Tonkin. — Voisin du précédent, très distinct par la sculpture élytrale.

**D. instriatus** n. sp. Oblongus, parum nitidus, niger; thorace satis lato, minute et sparse punctato; elytris instriatis, minute lineato-punctatis, intervallis latis, subalutaceis. Long. 15 mill. Chine. — Voisin de *crassicrus* Frm., moins brillant et moins nettement ponctué.

Le **D. nitidus** mihi, de Formose, est un peu moins robuste que le précédent, très brillant et a les élytres finement striés-ponctués avec les intervalles ponctués.

**D. laosensis** n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, niger; thorace supra parum inæquale, minute et sparse punctato; elytris fere instriatis, minute lineato-punctatis, intervallis deplanatis, parum punetatis. Long. 18 mill. Laos. — Voisin de *grandipes* Frm., prothorax plus robuste, élytres à sculpture différente avec les intervalles plus plans.

**D. annulipes** n. sp. Parum elongatus, nitidus, niger, femoribus rufo annulatis; thorace robusto, minute sat sparse punctato; elytris fortiter striato-punctatis, intervallis convexus. Long. 10 à 11 mill. Benito. — Voisin de *sanguinicrus* Frm., avec les élytres différents.

**D. ruficollis** n. sp. Parum elongatus, subnitidus, niger, thorace, femoribus ad basin et infra corpore pro parte rufis, elytris nigris, late rufo bimaculatis, striato-punctatis, intervallis subconvexis. Long. 10 mill. Congo. — Voisin de *4-plagiatus* Frm., distinct, à première vue, par son prothorax roux.

**Strongylium angustissimum** n. sp. Angustatus, piœus, pro parte viridi-ænescens; capite breve, oculis approximatis; antennis elongatis; thorace subquadrate, dense punctato, sulcato; elytris late foveolatis et

plicatis, intervallis costulatis; pedibus gracilibus. Long. 12 mill. Yunnan. — Espèce facile à reconnaître à sa forme étroite, subparallèle.

**St. Phungi** n. sp. *Elongatus*, postice attenuatus, viridescens, supra semi-cupreus; oculis approximatis; antennis brevibus; thorace breve, dense punctato-ruguloso, sulcato, lateraliter minute tuberculato; elytris ad suturam triimpressis, antice lineato-foveolatis, postice punctato-striatis, intervallis pro parte costatis, minute punctatis; pedibus satis brevibus. Long. 18 mill. Tonkin. — Voisin de *subimpressum* Frm., plus large et tête plus relevée en avant.

**St. vagepubens** n. sp. *Elongatus*, postice attenuatus, viridescens, supra semi-ænescens, elytris parum pubescentibus, ad suturam multi impressis. Long. 20 mill. Tonkin. — Forme et sculpture de *impressipenne* Pic, en diffère par le dessus moins nettement pubescent, le prothorax à rebord antérieur plus marqué, les yeux un peu moins rapprochés.

**St. difforme** n. sp. *Oblongus*, nitidus, niger, antennis ad basin, pedibus abdomineque rufis; thorace parum elongato, inæquale, lateraliter et in disco sulcato; elytris satis brevibus, pro parte foveolatis, pro parte carinato-tuberculatis; femoribus validis, tibiis arcuatiss. Long. 11 mill. Laos. — Espèce très distincte par sa sculpture élytrale et la forme de son prothorax dont la carène latérale est sinuée, coudée postérieurement et flanquée d'un sillon interne. — Peut, par sa structure thoracique, rentrer dans un sous-genre nouveau, que je nomme *Pseudocaelophus*.

**St. atricolor** n. sp. *Elongatus*, nitidus, niger; thorace subquadrato, mediocre sat sparse punctato; elytris fortiter punctato-striatis, punctis postice minutis. Long. 20-25 mill. Laos, Tonkin (coll. Pic et Vitalis). — Voisin de *aratum* Frm., prothorax à ponctuation écartée, élytres moins profondément ponctués.

**St. subfoveolatum** n. sp. Angustatus, viridi-metallicus, antennis cyaneis, apice rufis; thorace satis angustato, dense punctato-ruguloso, sulcato; elytris angustatis; ad suturam multi impressis, lineato et irregulariter foveolatis; pedibus gracilibus. Long. 16 mill. Tonkin. — Espèce voisine de *impressipenne* Pic, très distincte par sa forme étroite et sa sculpture élytrale faite de rangées de foveoles brillantes, vertes, bordées d'une arête irrégulière cuivreuse.

**St. viridimembris** n. sp. Elongatus, parum nitidus, aeneus, pedibus viridibus, antennis cyaneis; thorace fere quadrato, dense ruguloso-punctato, subsulcato; elytris fortiter striatis et antice crenulato-punctatis; pedibus gracilibus. Long. 20 mill. Laos. — Peut se placer près de *holcopterum* Frm.

**St. crurale var. nov. semipurpureum.** Supra aeneus, pro parte purpureo tinctus, femoribus nigris, ad basin paulo rufescens. Laos.

**St. crurale var. nov. subconcolor.** Elytris viridibus, femoribus late rufis. Laos (coll. Vitalis et Pic).

La var. nov. **semiplicatum** (du Laos), de coloration analogue au précédent, présente une forme plus étroite, et les intervalles des élytres sont en partie plissés antérieurement. — Quant à la var. nov. **rufotibiale**, du Laos, elle a les pattes rousses, avec les tibias en partie foncés.

**St. sparseimpressum** n. sp. Oblongo-elongatus, nitidus, niger, supra aeneus; thorace breve, sat sparse punctato, sulcato et impresso, elytris antice irregulariter et diverse impressis, apice fere lœvibus; pedibus gracilibus. Long. 22 mill. Laos. — Espèce très distincte par sa sculpture élytrale; voisine de *Saccomanti* Pic.

**St. angustior** n. sp. Elongatus, nitidus, griseo-pubescent, nigro-cyanescens, supra aeneus; thorace breve, dense ruguloso-punctato, sulcato et impresso; ely-

tris antice diverse, pro parte late, impressis aut punctatis, apice striatis; pedibus elongatis. Long. 17 mill. Vang-Vai, V. — Espèce très distincte, parmi les espèces pubescentes, par sa forme allongée.

**St. impressiceps** n. sp. Oblongus, nitidus, griseo pubescens, niger, elytris rufis, sat dense punctatis aut plicatis et minute lineato punctatis; capite distincte impresso; pedibus elongatis, tibiis curvatis. Long. 13 mill. Laos. — Diffère, au moins, de *cariosipenne* Frm., par la coloration et les tibias arqués.

**Hoplonyx substriatus** n. sp. Parum elongatus, subnitidus, niger, antennis apice tarsisque rufescentibus; oculis satis distantibus; thorace breve, lateraliter subarcuato, sat dense punctato, medio longitudinaliter lâeve; elytris minute striato-punctatis, intervallis alutaceis, fere impunctatis. Long. 17 mill. Abyssinie. — Très distinct de *subopacus* Frm. par sa sculpture.

**H. Martini** n. sp. Elongatus, nitidus, glaber, niger, vage subænescens, antennis apice rufis; oculis distantibus; thorace breve, lateraliter fere recto, dense punctato et pro parte plicato; elytris mediocre striato-punctatis, intervallis fortiter et multi-punctatis. Long. 9 mill. Natal. — Voisin de *micans* Schf., mais non métallique.

**H. viridipennis** n. sp. Elongatus, nitidus, glaber, rufus, capite postice piceo, thorace elytrisque viridis; oculis fere conjunctis; thorace sat dense punctato, postice impresso; elytris striatis, intervallis pro parte subconvexis, distincte punctatis. Long. 7 mill. Gabon. — A placer près de *impressicollis* Geb., prothorax moins impressionné et coloration différente.

**H. rufimembris** n. sp. Oblongus, parum nitidus, nigro-piceus, vage subæneus, membris rufis; thorace postice multi impresso; in disco sulcato; elytris crenato-striatis, intervallis subcostatis, minute punctatis. Long. 7 mill. Gabon. — Voisin de *impressicollis* Geb., distinct, à première vue, par sa sculpture élytrale.

**H. foveolatus** n. sp. Elongatus, nitidus, glaber, piceus, membris rufis, thorace elytrisque subæneis; oculis parum approximatis; thorace breve, lateraliter fere recto, minute et sparse punctato; elytris lineato et diverse foveolatis. Long. 12 mill. Sierra Leone. — Espèce très distincte par ses élytres présentant des fossettes variables, subarrondies ou allongées.

**H. elongatus** n. sp. Elongatus, nitidus, glaber, nigro-piceus, antennis ad basin tarsisque rufis; oculis valde distantibus; thorace breve, lateraliter fere recto, postice parum impresso, dense punctato; elytris antice striato-crenulatis et postice striatis, intervallis subconvexis, fere impunctatis. Long. 10 mill. Congo. — Peut se placer près de *alleculoides* Th.

**H. sibutensis** n. sp. Elongatus, nitidus, glaber, niger, oculis approximatis; thorace parum dense punctato; elytris antice fortiter striato-punctatis et postice striatis, intervallis pro parte deplanatis, minute punctatis. Long. 12-14 mill. Fort Sibut. — Diffère, du précédent par le prothorax plus robuste, la coloration plus foncée, etc.

Le **rufipes** mihi, de la même origine, et très voisin du précédent, en diffère par la coloration plus foncée, les pattes rousses, la ponctuation du prothorax assez fine et écartée; par contre, le **latior**, mihi, de la Côte d'Ivoire, de coloration générale foncée, est plus court et large, avec le prothorax moins brillant que les élytres.

**H. rhodesianus** n. sp. Parum elongatus, glaber, nitidus, piceus, antennis ad basin, pedibus elytrisque rufescens; oculis satis approximatis; thorace breve, fortiter et dense punctato, fere impresso; elytris fortiter striatis, striis antice fortiter et postice minute punctatis, intervallis subconvexis, fere impunctatis. Long. 12 mill. Rhodesia. — Distinct, à première vue, des précédents, par la ponctuation plus dense du prothorax.

**H. elongatior** n. sp. Parum, elongatus, glaber, nitidus, niger aut piceus, membris rufis; oculis approximatis; thorace breve et lato, minute et sparse punctato; elytris lineato-punctatis, et pro parte substriatis, punctis apice minutis. Long. 13-14 mill. Congo. — Voisin de *evanescens* Geb., plus allongé, prosternum moins étroit, etc.

**H. rufus** n. sp. Elongatus, nitidus, glaber, rufus, oculis valde approximatis; thorace breve, lateraliter subarcuato, minute et sparse punctato; elytris lineato-punctatis et pro parte substriatis. Long. 12 mill. Congo. — Voisin du précédent.

**H. ivoirensis** n. sp. Oblongus, nitidus, glaber, nigro-piceus, supra subæneus, membris pro parte rufis; oculis valde distantibus; thorace dense punctato; elytris lineato-foveolatis. Long. 13 mill. Côte d'Ivoire. — Espèce très distincte par sa sculpture élytrale, jointe à la ponctuation dense du prothorax, pouvant se placer près de *distinctus* Duv.

Le **benitensis** mihi, de Benito, est plus robuste, avec le prothorax moins densément ponctué, les élytres sont plus larges, un peu striés, roussâtres et un peu mats à l'extrémité.

**Eupezus rufonotatus** n. sp. Subovatus, parum nitidus, piceo-iridescens, elytris postice rufo notatis, membris rufis; thorace sparse punctato; elytris striato-punctatis, intervallis convexis; tibiis anticis et intermediis longe villosis ♂. Long. 13 mill. Côte d'Ivoire. — Peut se placer près de *minor* Geb.

**E. nitidus** n. sp. Oblongus, nitidus, niger, thorace sparse punctato; elytris striato-punctatis, intervallis convexis; tibiis sparse et breve pubescentibus. Long. 13 mill. Côte d'Ivoire. — Peut se placer près de *minor* Geb.

---

**TABLE  
POUR LE TRENTÉ-SEPTIÈME FASCICULE**

---

	Page
Nouveautés diverses . . . . .	1

